

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Grandes Cultures

REGION LORRAINE

Bulletin technique n° 10 du 29 avril 1999

Colza

Les colzas les plus précoces sont en fleur, les premiers pétales ont chuté.

Rappel

Réaliser le traitement fongicide dans les parcelles qui arrivent au stade chute des premiers pétales (voir message des Avertissements Agricoles précédents).


Charançon des siliques

On peut observer des charançons en Moselle, en sud Meuse et un peu en Meurthe-et-Moselle. Pour le moment le seuil de traitement n'est pas atteint.

Mélanger un insecticide avec le fongicide ne sera intéressant que dans très peu de situations. Surveiller attentivement vos parcelles. La persistance d'action du produit à ce moment n'est que de l'ordre de 3 à 4 jours. Une intervention actuelle est souvent prématurée.

Ne pas mélanger insecticide et fongicide lors de la floraison, du fait du risque de phytotoxicité vis-à-vis des abeilles.

N'intervenir que lorsque vous comptez en moyenne 1 charançon pour 2 plantes.



Charançon des siliques
Taille réelle : 2,5 - 3 mm
couleur gris ardoisé.

Céréales

Les blés sont au stade 2 noeuds, les premières orges arrivent au stade sortie dernière feuille.

Situation

Dans les parcelles non traitées, la rhynchosporiose est sur la 3ème, voire 2ème feuille des orges. L'helminthosporiose est presque totalement absente.

Sur blé, la septoriose évolue peu. Elle est toujours visible sur F4. Elle ne devrait pas évoluer dans le courant de cette semaine. Comme la semaine dernière, le modèle PRESEPT indique toujours un risque très faible, exception faite du secteur d'Ancerville qui, comme prévu, a vu son risque s'aggraver et devenir moyen à élevé.

Préconisation

Sur orge, le premier traitement doit être terminé. Attendre la sortie des barbes pour un éventuel renouvellement si le premier traitement date de plus de 15 jours.

De nouvelles précisions vous seront données dans le prochain bulletin.

Sur blé, les indications de la semaine précédente restent valables. Excepté le secteur d'Ancerville-Revigny (55), on peut attendre pour traiter la septoriose. Celui-ci n'interviendra pas avant la fin de la semaine prochaine, ce qui permet d'envisager un traitement unique. De nouvelles précisions dans le prochain bulletin.

Colza :

Traitement
Sclerotinia.

Orge :

Traitement
rhynchosporiose.

Blé :

Attendre.

Labo Vert

Prochains rendez-vous

Date	Lieu	Heure de rendez-vous
30 avril	Saizerais (54) - M. BEAU	10 h
3 mai	Limey (54) - M. JACQUIN Olivier	10 h
4 mai	Coincourt (54) - M. CASTET	9 h 30
5 mai	Hurcourt (54) - M. KOCH E. Mainville (54) - 2 km en allant vers Briey	10 h 13h30
6 mai	Ancerville (55) - M. MARTINOT Vadelaincourt (55) - M. BRY Montzeville (55) - M. MIGEON	9 h 30 13 h 30 15 h 30
7 mai	Gignéville (88) Pompierre (88)	9 h 45 14 h
10 mai	Pixerécourt (54) - Lycée Agricole Colombey-les-Belles (54)	9 h 30 14 h
11 mai	Fraimbois (54) - M. GENEY Vého (54) - M. THIERY J.M.	10 h 14 h
12 mai	Armaucourt (54) - Devant cimetière Benney (54) - M. BARBIER B.	9 h 30 14 h

Etat des cumuls de pluie entre le 21 et le 28 avril 1999

Poste	Hauteur en mm
Coyviller (54)	3,0
Doncourt-les-Conflans (54)	7,0
Laronxe (54)	4,5
Lucey (54)	6,0
Port-sur-Seille (54)	2,5
Ancerville (55)	8,0
Arrancy-sur-Crusne (55)	5,5
Méligny-le-Petit (55)	2,0
Montzeville (55)	6,5
Albestroff (57)	6,5
Buy (57)	14,0
Chateau-Salins (57)	1,0
Courcelles-Chaussy (57)	4,0
Laquenexy (57)	2,0
Attignéville (88)	7,5